

Target™ 24 SC

Etiqueta Web - Centroamérica

INSECTICIDA SULFOXIMINA SULFOXAFLOR

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS**

Composición química:

	p/v
[methyl(oxo){1-[6-(trifluoromethyl)-3-pyridyl]ethyl}-γ6-sulfanylidene]cyanamide	24,0 %
Ingredientes inertes	76,0 %
Total	100,0 %

Contiene: 240 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE.

DENSIDAD: 1,10 g/mL a 20 °C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



FORMULADO POR:

Dow AgroSciences / Helena Chemical 34 Fenn Road
P.O. Box 837, Cordele Ga 31010, Estados Unidos. Teléfono: 1-229-273-6243

® TM Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow

Target™ 24 SC

Etiqueta Web - Centroamérica

INSECTICIDA SULFOXIMINA SULFOXAFLOR

USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

El **Target™ 24 SC** es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis y finalmente mueren poco tiempo después. **Target™ 24 SC** actúa en los receptores nicotínicos de la acetilcolina en un punto novedoso, por lo que no presenta resistencia cruzada con insecticidas existentes en el mercado.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Emplear equipo terrestre en óptimo estado y bien calibrado. Éste debe permitir una homogénea y adecuada cobertura del follaje.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Agregue la mitad de agua en el tanque de aplicación, agregue la dosis recomendada de **Target™ 24 SC**, agite, termine de llenar con agua el tanque y agite bien, agregue el adyuvante y complete el volumen de agua para terminar de llenar el tanque.



RECOMENDACIONES DE USO:

Para Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá.

Target™ 24 SC

Etiqueta Web - Centroamérica

INSECTICIDA SULFOXIMINA SULFOXAFLOR

CULTIVOS	PLAGAS A CONTROLAR	DOSIS RECOMENDADA	RECOMENDACIONES
Melón <i>Cucumis melo</i>	Mosca blanca, <i>Bemisia tabaci</i>	300 a 400 mL/ha (210 a 280 mL/mz)	Realizar un máximo de 3 aplicaciones de Target™ 24 SC por ciclo de cultivo, en rotación con insecticidas de diferente modo de acción. La primera aplicación se debe hacer al momento de la colonización de la plaga. Realizar aplicaciones adicionales en caso de que haya reinfestación de plaga. Se debe usar un adyuvante a la dosis recomendada por el fabricante. El volumen de aplicación puede oscilar entre 300 y 600 L/ha, dependiendo del estado de desarrollo del cultivo. Use un volumen de aplicación que permita una adecuada cobertura del follaje. Target™ 24 SC actúa sobre los diferentes estados de desarrollo de las plagas, sin embargo se recomienda su uso en las etapas iniciales.
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>	Mosca blanca, <i>Bemisia tabaci</i>	400 mL/ha (280 mL/mz)	
Pepino <i>Cucumis sativus</i>	Áfidos, <i>Aphis gossypii</i>	50 mL/ha (35 mL/mz)	

ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Target™ 24 SC puede ser aplicado en cualquier fase de desarrollo del cultivo. Realice la aplicación cuando la inspección de campo indique que se ha alcanzado el umbral económico.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Para melón, pepino y tomate mantener un intervalo de 7 a 12 días entre aplicaciones, dependiendo del nivel de infestación. Rotar con insecticidas de diferente modo de acción.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Para los cultivos de melón, pepino y tomate es de 1 día.

PERÍODO PARA REINGRESO AL CAMPO TRATADO:

24 horas.

FITOTOXICIDAD:

Target™ 24 SC no causa ningún efecto a los cultivos en donde se recomienda su uso si se siguen las instrucciones establecidas para su aplicación.

COMPATIBILIDAD:

No presenta problemas de compatibilidad si se mezcla con insecticidas o fungicidas tradicionalmente usados en los cultivos recomendados. Sin embargo, se deben hacer pruebas de compatibilidad previas.

Target™ 24 SC

Etiqueta Web - Centroamérica

INSECTICIDA SULFOXIMINA SULFOXAFLOR

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico y pecuario en general. Tanto en el transporte como en el almacenamiento procure que no esté el producto con ningún tipo de herbicida. Almacénese bajo llave, en un lugar fresco y seco; alejado del calor. Los residuos sin usar deben guardarse en su envase original debidamente cerrado y procurando que su etiqueta se encuentre bien adherida.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Puede causar irritación a los ojos. La ingestión accidental en pequeñas cantidades como resultado de operaciones de manejo es poco probable que provoque lesiones, sin embargo la ingesta de cantidades grandes sí causará lesiones. Los vapores pueden causar irritación al tracto respiratorio (nariz, garganta).

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Llame de inmediato a un médico o al centro de control de intoxicaciones. No induzca el vómito a menos que así lo aconseje el médico o el centro de control de intoxicaciones. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Retire el material del cuerpo inmediatamente lavando con bastante agua por 15 a 20 minutos. Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se lava. Busque atención médica si la irritación persiste.

POR INHALACIÓN: Mueva a la persona hacia el aire fresco. Si la persona no está respirando, llame a una ambulancia, luego aplique respiración artificial.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente con agua por 15 a 20 minutos. Retire los lentes de contacto si están presentes, después de los primeros 5 minutos, y luego continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico para consejos sobre el tratamiento.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento a la exposición deberá dirigirse al control de síntomas y a la condición clínica del paciente.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Información Toxicológica. Centro de Intoxicaciones.	(502) 2230-0807 (502) 2232-0735
Belice	Unidad de Epidemiología.	(501) 223-1639
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	(504) 2232-2322
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 ext. 17
Costa Rica	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones.	(506) 2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos.	(507) 523-4948 (507) 523-4968
República Dominicana	Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan) Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello	(809) 684-3478/3672 (809) 681-7828

Target™ 24 SC

Etiqueta Web - Centroamérica

INSECTICIDA SULFOXIMINA SULFOXAFLOR

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

**CONSULTE AL PROFESIONAL
EN CIENCIAS AGRÍCOLAS, ANTES DE
COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.**

**PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS
RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.**

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



TÓXICO PARA ABEJAS.

**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES
CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES
O EMPAQUES VACÍOS.**

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y deposítelos en un recipiente hermético; entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES
EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE
FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO
LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente, no se responsabilizan por el mal uso que se le dé o sea diferente al estipulado en este panfleto y etiqueta.

PAÍS	No. DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	479-120	20-09-2013
HONDURAS	976-365-III	22-05-2013
PANAMÁ	5738	19-04-2012